

ตัวชี้วัด ปี 2558

เอกสารประกอบการตรวจประเมินตัวชี้วัดโรคหัวใจปี 2558

ชื่อ โรงพยาบาล.....จังหวัด..... เขต.....เป็นโรงพยาบาลในระดับ.....

ตัวชี้วัดที่ 1 อัตราการตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ หมายถึง จำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจใน
ช่วงเวลาเดียวกัน ต่อประชากรแสนคนในช่วงปีนั้น (รหัส ICD-10-TM = I20-I25) ไม่เกิน 23 ต่อประชากรแสนคน

ICD - 10	จำนวนผู้ป่วยโรค หลอดเลือดหัวใจ ทั้งหมด (ICD-10;I20-I25) (A)	จำนวนผู้ป่วยโรค หลอดเลือดหัวใจ ทั้งหมดที่เสียชีวิต (ICD-10;I20-I25) (B)	ร้อยละผู้ป่วยโรค หลอดเลือดหัวใจ ทั้งหมดที่เสียชีวิต (ICD-10;I20-I25) B/A x 100	หมายเหตุ
I20;Angina				
I21;Acute MI				
I22;Subsequent MI				
I23; Complications following acute MI				
I24,Other acute IHD				
I25;Chronic IHD				
I20-I25				

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ได้รับยาละลายลิ่มเลือด และหรือขยายหลอดเลือดหัวใจมากกว่าหรือเท่ากับ 70-75%

จำนวนผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ชนิด STEMI ทั้งหมด (A)	จำนวนผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ชนิด STEMI ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด (B)	จำนวนผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ชนิด STEMI ที่ได้รับการขยายหลอดเลือดหัวใจ (C)	ร้อยละของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด และหรือขยายหลอดเลือดหัวใจ $B+C/A \times 100$	หมายเหตุ

ตัวชี้วัดที่ 3 มีการจัดตั้ง warfarin clinic ในโรงพยาบาลระดับ A ทุกแห่ง โดยสหวิชาชีพประกอบด้วย บุคลากรอย่างน้อย 3 กลุ่มวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ พยาบาลและเภสัชกร

ระดับของโรงพยาบาล	มี warfarin clinic	ไม่มี warfarin clinic	หมายเหตุ
รพศ. (A)			
รพท. (S)			
รพท.ขนาดเล็ก (M 1)			
รพช.แม่ข่าย (M 2)			
รพช.ขนาดใหญ่ (F1)			
รพช.ขนาดกลาง (F2)			
รพช.ขนาดเล็ก (F3)			

ตัวชี้วัดที่ 4 มีการจัดตั้ง Heart failure clinic อย่างน้อย 1 แห่งในเขตบริการ โดยสหวิชาชีพ
ประกอบด้วยบุคลากรอย่างน้อย 3 กลุ่มวิชาชีพได้แก่ แพทย์ พยาบาลและเภสัชกร

ระดับของโรงพยาบาล	มี Heart failure clinic	ไม่มี Heart failure clinic	หมายเหตุ
รพศ. (A)			
รพท. (S)			
รพท.ขนาดเล็ก (M 1)			
รพช.แม่ข่าย (M 2)			
รพช.ขนาดใหญ่ (F1)			
รพช.ขนาดกลาง (F2)			
รพช.ขนาดเล็ก (F3)			